

05a: 新規圧迫創傷(褥瘡)発生率

分母	調査期間初日(0時時点)の入院患者数+調査期間に新たに入院した患者数
分子	d2以上の褥瘡の院内新規発生患者数
備考	
概要	褥瘡(床ずれ)は予防的ケアで防止することが重要です。ひとたび褥瘡が発生すると治りにくく、在院日数の延長や患者への苦痛を伴うことが多いため、患者への大きな負担となります。褥瘡が発生する危険因子を把握し、予防対策を行うことが重要で、本指標はその質を評価をする指標となります。

施設コード	調査開始日	調査終了日	分母数	分子数	割合
210111438	20230401	20240331	22,124	52	0.24%
210111438	20240401	20250331	21,126	59	0.28%
210111438	20250401	20260331	20,962	59	0.28%
210111438	20260401	20270331			#DIV/0!
210111438	20270401	20280331			#DIV/0!
210111438	20280401	20290331			#DIV/0!
210111438	20290401	20300331			#DIV/0!
210111438	20300401	20310331			#DIV/0!
210111438	20310401	20320331			#DIV/0!
210111438	20320401	20330331			#DIV/0!
210111438	20330401	20340331			#DIV/0!
210111438	20340401	20350331			#DIV/0!

