

19:脳梗塞患者のスタチン処方割合

| | |
|----|---|
| 分母 | 脳梗塞で退院した症例数 |
| 分子 | 分母のうち、スタチンが投与された症例数 |
| 備考 | 以下の場合を除外 ・入院期間が2日以内の場合 ・転帰が死亡の場合 |
| 概要 | 脂質と脳梗塞との関係は心臓病ほど密接ではないものの、欧米の研究ではLDLコレステロールを低下させるほど、脳卒中の発症率、死亡率が下がると報告されている。また、海外の大規模臨床試験(SPARCL)で、高用量のスタチン製剤による脳卒中の再発抑制が示されました。脳梗塞後の高LDL-C血症患者にはスタチンを投与すべきであり、本指標はその投与割合を示しています。 |

| 施設コード | 調査開始日 | 調査終了日 | 分母数 | 分子数 | 割合 |
|-----------|----------|----------|-----|-----|---------|
| 210111438 | 20150401 | 20160331 | 295 | 51 | 17.29% |
| 210111438 | 20160401 | 20170331 | 305 | 57 | 18.69% |
| 210111438 | 20170401 | 20180331 | 296 | 53 | 17.91% |
| 210111438 | 20180401 | 20190331 | 289 | 56 | 19.38% |
| 210111438 | 20190401 | 20200331 | 145 | 47 | 32.41% |
| 210111438 | 20200401 | 20210331 | 155 | 52 | 33.55% |
| 210111438 | 20210401 | 20220331 | 149 | 76 | 51.01% |
| 210111438 | 20220401 | 20230331 | 154 | 87 | 56.49% |
| 210111438 | 20230401 | 20240331 | 157 | 88 | 56.05% |
| 210111438 | 20240401 | 20250331 | 243 | 129 | 53.09% |
| 210111438 | 20250401 | 20260331 | | | #DIV/0! |
| 210111438 | 20260401 | 20270331 | | | #DIV/0! |

