

### 肛門がん

登録番号	レジメン名称	抗がん剤	投与量	単位	時間	手技	1コース	投与日	備考
03-096-02	肛門がん six weekly Capecitabine(1650)/MMC(10)-CRT	カベシタピン	1650	mg/m2		内服	42日	day1-5,8-12,15-19,22-26,29-33,36-38	カベシタピンの投与量(初回投与量)は体表面積により以下のとおりとする 1.31m2未満 900mg×2回 1.31m2以上1.64m2未満 1200mg×2回 1.64m2以上 1500mg×2回
		マイトマイシン	10	mg/m2	全開	点滴		day1,29	
03-102-01	肛門がん CDDP(75)/5-FU(1000)-CRT	5-FU	1000	mg/m2	24時間	持続点滴	28日	day1-4	
		シスプラチン	75	mg/m2	2時間	点滴		day1	
03-132-01	肛門がん monthly Capecitabine(1650)/MMC(10)-CRT	カベシタピン	1650	mg/m2		内服	28日	day1-5,8-12,15-19,22-26	カベシタピンの投与量(初回投与量)は体表面積により以下のとおりとする 1.31m2未満 900mg×2回 1.31m2以上1.64m2未満 1200mg×2回 1.64m2以上 1500mg×2回  ・放射線治療日のみカベシタピンを内服する(休日等で放射線を行わない場合にはカベシタピンも内服しない、放射線治療が遅れた場合にはカベシタピンも内服する) ・カベシタピンは5日間連日経口投与、その後2日間休業(通常放射線は月曜日から金曜日に施行するため) ・カベシタピンは朝夕食後30分以内に服用 ・放射線治療が終了した3コース目以降のカベシタピンは5日間連日経口投与、その後、2日間休業
		マイトマイシン	10	mg/m2	全開	点滴		day1	