

脳腫瘍

登録番号	レジメン名称	抗がん剤	投与量	単位	時間	手技	1コース	投与日	備考
11-002-01	脳腫瘍 ICE	ペブシド	60	mg/m ²	90分	点滴	28日	day1-5	
		イホマイド	900	mg/m ²	90分	点滴			
		ランダ	20	mg/m ²	2時間	点滴			
11-004-01	脳腫瘍 VP16(150)/CBDCA(450)	ペブシド	150	mg/m ²	90分	点滴	28日	day1-3 day1	
		カルボプラチン	450	mg/m ²	90分	点滴			
11-005-04	脳悪性リンパ腫 MTX(3500)	メトレキサート	3500	mg/m ²	6時間	点滴	14日	day1	
11-006-01	再発悪性神経膠腫 BV(10)	ベバシズマブ	10	mg/kg	90分	点滴	14日	day1	
11-007-02	悪性神経膠腫 BV(10)/テモゾロミド(75)-CRT	ベバシズマブ	10	mg/kg	90分	点滴	42日	day1,15,29,42	
		テモゾロミド	75	mg/m ²		内服			
11-008-02	悪性神経膠腫 BV(10)/テモゾロミド(150)	ベバシズマブ	10	mg/kg	90分	点滴	28日	day1,15	先行するBV/テモゾロミド-CRT療法終了後4週間の休薬が必要 テモゾロミドは1クール目150mg/m ² /日 忍容性が確認された場合は 2クール以降より200mg/m ² /日に増量する
		テモゾロミド	150	mg/m ²		内服			
11-009-01	悪性神経膠腫 維持療法BV(15)	ベバシズマブ	15	mg/kg	90分	点滴	21日	day1	
11-010-01	悪性神経膠腫 Temozolomide(75)-CRT(放射線併用投与時)	テモゾロミド	75	mg/m ²	90分	点滴	70日	day1-42	・放射線が終了したらテモゾロミドも終了する可能性がある。放射線が終了してテモゾロミドが終了した場合は、28日休薬して放射線併用時のコースが終了する。放射線が終了したがテモゾロミドが終了しなかった場合は放射線併用時のスケジュールに準ずる。 ・本剤単独にて、テモゾロミドとして150mg/m ² を1日1回5日間投与し、23日間休薬する。この28日を1コースとし、次コースでは1回200mg/m ² に増量することができる。 次コースで1回200mg/m ² に増量することができる。
	悪性神経膠腫 Temozolomide(75)-CRT(単独投与時)	テモゾロミド	150	mg/m ²	90分	点滴	28日	day1-5	
11-011-01	悪性神経膠腫 Temozolomide(150)	テモゾロミド	150	mg/m ²	90分	点滴	28日	day1-5	
11-012-01	脳悪性リンパ腫 MTX(3500) (I-LV)	メトレキサート	3500	mg/m ²	6時間	点滴	14日	day1	